

Wykaz chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych
(wg wzoru nr 11 Instrukcji sporządzania Programu Ochrony Przyrody)
występujących na terenie Nadleśnictwa Myszyniec

stan na 29.09.2017 r.

Lp.	Gatunek (nazwa polska, łacińska)	Leśnictwo Ilość stanowisk	Opis ogólny, sposób występowania, dynamika rozwojowa (zanik, zwiększenie arealu)	Opis obiektu, kategoria gruntu, walory przyrodnicze	Zagrożenia	Zabiegi uzgodnione z RDOŚ
1.	Widłak goździsty <i>Lycopodium clavatum</i>	Niedźwiedź 1 stanowisko Brzozowy Kąt 7 stanowisk Czarnia 1 stanowisko Zdunek 1 stanowisko Kadzidło 17 stanowisk Siarcza Łąka 6 stanowisk Podgórze 5 stanowisk Dylewo 15 stanowisk Warmiak 27 stanowisk Serafin 2 stanowiska Razem 82 stanowiska	Łanowo, gatunek częsty, dynamika rozwrojowa nastalym poziomie	Gatunek światłolubny, preferuje suche bory sosnowe (gleby ubogie, bardzo kwaśne)	Zrywanie do celów lecniczych i dekoracyjnych	

2.	Widłak jałowcowaty <i>Lycopodium annotinum</i>	Niedźwiedź 2 stanowiska Białusny Lasek 4 stanowiska Brzozowy Kąt 13 stanowisk Czarnia 2 stanowiska Rutkowo 10 stanowisk Surowe 2 stanowiska Kadzidło 29 stanowisk Siarcza Łąka 13 stanowisk Podgórze 23 stanowisk Dylewo 13 stanowisk Warmiak 46 stanowisk Rudne 2 stanowiska Dęby 9 stanowisk Serafin 4 stanowiska Lipniki 6 stanowisk Razem 191 stanowisk	Łanowo, gatunek częsty, dynamika rozwojowa nastąpiła w poziomie	Wilgotne siedliska borów sosnowych, miejsca ocienione.	Osuszanie siedlisk, zrywanie do celów leczniczych i dekoracyjnych.	
3.	Widłak spłaszczony <i>Lycopodium complanatum</i>	Niedźwiedź 4 stanowiska Czarnia 2 stanowiska Rutkowo 6 stanowisk Kadzidło 9 stanowisk Siarcza Łąka 10 stanowisk	Pojedynczo i grupowo, gatunek częsty, dynamika rozwojowa nastąpiła w poziomie	Siedliska borowe, miejsca o umiarkowanym ocienieniu.	Przekształcenie suchych borów sosnowych o ubogim składzie w inny typ fitocenozy,	

	Widłak spłaszczony <i>Lycopodium complanatum</i>	Podgórze 2 stanowiska Dylewo 11 stanowisk Warmiak 9 stanowisk Dęby 2 stanowiska Serafin 2 stanowiska Razem 57 stanowiska	Łanowo, gatunek częsty, dynamika rozwojowa nastalym poziomie	Siedliska borowe, miejsca o umiarkowanym ocienieniu.	o bogatym runie, z silniejszymi konkurencyjnie trawami, zrywanie	
4.	Widłak wroniec <i>Huperzia selago</i>	Zdunek 1 stanowisko	Grupowo, dynamika rozwojowa nastalym poziomie	Wilgotne siedliska borów sosnowych, miejsca ocienione.	Brak	
5.	Skrzyp zimowy <i>Equisetum hyemale</i>	Dylewo 1 stanowisko	Kępowo, zwiększa swój areał	Rośnie na wilgotnych łąkach i w podmokłych lasach o przepuszczalnym podłożu.	Osuszanie siedlisk	
6.	Paprotka zwyczajna <i>Polypodium vulgare</i>	Białusny Lasek 1 stanowisko Dylewo 8 stanowisk Kadzidło 1 stanowisko Warmiak 6 stanowisk Rudne 1 stanowisko Dęby 1 stanowisko Lipniki 2 stanowiska Razem 20 stanowisk	Pojedynczo, grupowo i kępowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Różnorodne siedliska, lasy liściaste, bory sosnowe i mieszane, miejsca umiarkowanie ocienione	Pozyskiwanie na cele lecznicze, wykopywanie	

7.	Gnieźnik leśny <i>Neottianidus-avis</i>	Rutkowo 1 stanowisko	Pojedynczo, w zaniku	Lasy liściaste i mieszane	Brak	
8.	Kruszczyk szerokolistny <i>Epipactis helleborine</i>	Czarnia 2 stanowiska Wykrot 3 stanowiska Razem 5 stanowisk	Pojedynczo i grupowo, dynamika rozwojowa malejąca	Prześwietlone miejsca w lasach i zaroślach	Konkurencja międzygatunkowa	
9.	Lilia złotogłów <i>Lilium martagon</i>	Niedźwiedź 1 stanowisko	Pojedynczo, stanowisko zanika	Żyzne siedliska i zarośla	Zrywanie i wykopywanie, konkurencja międzygatunkowa	
10.	Storczyk plamisty <i>Orchis maculata</i>	Wykrot 1 stanowisko Karaska 1 stanowisko Rudne 2 stanowiska Razem 4 stanowiska	Pojedynczo i grupowo, dynamika rozwojowa malejąca	Torfowiska niskie i przejściowe, wilgotne łąki, olsy	Osuszanie terenów podmokłych, sukcesja drzew i krzewów	
11.	Storczyk szerokolistny <i>Orchis latifolia</i>	Warmiak 1 stanowisko	Pojedynczo, dynamika rozwojowa malejąca	Podmokłe łąki i obrzeża wilgotnych lasów	Osuszanie siedlisk, sukcesja krzewów	
12.	Arnika górską <i>Arnica montana</i>	Kadzidło 3 stanowiska Rudne 5 stanowiska Dęby 1 stanowisko Serafin 7 stanowisk Razem 16 stanowisk	Pojedynczo i grupowo, dynamika rozwojowa nastalym poziomie	Gatunek światłolubny, znoszący okresowe ocienienie, na niżu występuje w borach sosnowych i w lasach mieszanych (obrzeża lasów, śródleśne polany, przydroża)	Pozyskiwanie dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego	

13.	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>	Niedźwiedź 2 stanowiska Czarnia 3 stanowiska Surowe 4 stanowiska Siarcza Łąka 1 stanowisko Razem 10 stanowisk	Dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Siedliska lasowe	Wycinanie grubych drzew oplecionych pnącym bluszczem	
14.	Goździk kropkowany <i>Dianthus deltoides</i>	Zdunek 1 stanowisko Karaska 1 stanowisko Razem 2 stanowiska	Pojedynczo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Warianty wilgotne siedlisk borowych	Zacienienie przez gatunki konkurencyjne, zmiana warunków światlnych	
15.	Goździk piaskowy <i>Dianthus arenarius</i>	Niedźwiedź 1 stanowisko Białusny Lasek 1 stanowisko Zdunek 1 stanowisko Karaska 1 stanowisko Rudne 8 stanowisk Warmiak 2 stanowiska Lipniki 1 stanowisko Razem 15 stanowisk	Drobnokępowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Murawy piaskowe, kserotermiczne, piaszczyste miejsca w borach i w borach mieszanych	Zacienienie przez gatunki konkurencyjne	

16.	Mącznica lekarska <i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Niedźwiedź 3 stanowiska Siarcza Łąka 3 stanowiska Podgórze 1 stanowisko Dylewo 4 stanowiska Karaska 4 stanowiska Razem 15 stanowisk	Kępowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Bory sosnowe, wrzosowiska	Pozyskiwanie dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego	
17.	Orlik pospolity <i>Aquilegia vulgaris</i>	Niedźwiedź 1 stanowisko	Pojedynczo i grupowo, w zaniku	Prześwietlone lasy liściaste i zarośla	Zrywanie i wykopywanie	
18.	Pomocnik baldaszkowy <i>Chimaphilla umbelata</i>	Niedźwiedź 1 stanowisko Czarnia 1 stanowisko Kadzidło 5 stanowisk Siarcza Łąka 7 stanowisk Podgórze 1 stanowisko Dylewo 11 stanowisk Warmiak 4 stanowiska Lipniki 1 stanowisko Razem 31 stanowisk	Łanowo i kępowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Bory sosnowe	Pozyskiwanie dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, zacienienie, konkurencja międzygatunkowa	
19.	Rosiczka okrągłolistna <i>Drosera rotundifolia</i>	Kadzidło 1 stanowisko Rudne 2 stanowiska Dylewo 1 stanowisko Lipniki 1 stanowisko Razem 5 stanowisk	Łanowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Ubogie torfowiska wysokie oraz torfowiska przejściowe	Osuszanie torfowisk	

20.	Sasanka otwarta <i>Pulsatilla patens</i>	Niedźwiedź 2 stanowiska Wykrot 2 stanowiska Karaska 2 stanowiska Kadzidło 1 stanowisko Podgórze 1 stanowisko Rudne 19 stanowisk Dęby 10 stanowisk Serafin 15 stanowisk Warmiak 5 stanowisk Lipniki 12 stanowisk Razem 69 stanowisk	Grupowo i pojedynczo, dynamika rozwojowa malejąca	Bory sosnowe, gleby bielcowe o odczynie kwaśnym	Zrywanie i wykopywanie, zacienienie, konkurencja międzygatunkowa, zmiany klimatyczne	
21.	Żurawina drobnolistna <i>Vaccinium microcarpon</i>	Warmiak 5 stanowisk Dylewo 1 stanowisko Razem 6 stanowisk	Łanowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Występuje w sosnowym borze bagiennym, na torfowiskach wysokich i przejściowych	Osuszanie siedlisk	
22.	Żurawina błotna <i>Vaccinium oxycoccus</i>	Podgórze 4 stanowiska Karaska 2 stanowiska Razem 6 stanowisk	Łanowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Występuje w sosnowym borze bagiennym, na torfowiskach wysokich i przejściowych	Osuszanie siedlisk	
23.	Kosaciec żółty <i>Iris pseudacorus</i>	Podgórze 1 stanowisko Karaska 1 stanowisko Razem 2 stanowiska	Kępowo, zmniejsza swój areał	Występuje w olsach i lasach łęgowych	Osuszanie siedlisk, zrywanie, łamanie	

24.	Modrzewnica zwyczajna <i>Andromeda polifolia</i>	Podgórze 2 stanowiska	Pojedynczo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Występuje na torfowiskach wysokich, przejściowych, w borach bagiennych, rzadko wilgotnych	Stanowisko położone w sąsiedztwie naturalnego pojnika zwierzyny, zagrożeniem jest wydeptywanie	
25.	Wawrzynek wilczelyko <i>Daphne mezereum</i>	Kadzidło 3 stanowiska Warmiak 2 stanowiska Razem 5 stanowisk	Grupowo, dynamika rozwojowa nastalym poziomie	Rośnie w świeżych i żyznych lasach liściastych, przechodzi również do borów mieszanych	Zrywanie, łamanie, wydeptywanie	
26.	Widlicz Zeillera <i>Diphasiastrum zeilleri</i>	Rutkowo 1 stanowisko	Kępowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Siedliska borowe, miejsca o umiarkowanym ocienieniu	Przekształcenie suchych borów sosnowych o ubogim składzie w inny typ fitocenozy, o bogatym runie, z mchami i silniejszymi konkurencyjnie trawami.	

27.	Gruszyczka jednostronna <i>Pyrola secunda</i>	Warmiak 5 stanowisk	Kępowo i łanowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Występuje w borach iglastych i mieszanych, na glebach świeżych, mezotroficznych o odczynie umiarkowanie kwaśnym.	Pozyskiwanie do celów leczniczych	
28.	Gruszyczka okrągłolistna <i>Pyrola rotundifolia</i>	Warmiak 1 stanowisko	Łanowo, dynamika rozwojowa na stałym poziomie	Występuje w borach iglastych i mieszanych, na glebach świeżych, mezotroficznych o odczynie umiarkowanie kwaśnym.	Pozyskiwanie do celów leczniczych	

Zestawiła: Martyna Lewandowska – Gross
Aktualizacja (2017r.) – Błażej Sakowski